

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。  
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。  
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。  
由於本產品是根據日本國家法律所製造銷售的產品，因此產品和文件內容不一定會遵守日本國以外的法律規定。  
本文件是將日文的產品資訊譯成中文以供您參考，請務必在使用時閱讀。  
請妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。

## チョコラBBドリンクR

第3類医薬品



## チョコラBBドリンクR<sup>®</sup>

緩和皮膚粗糙和口內炎症狀

- 從體內發揮作用，改善肌膚粗糙問題及內炎的 醫藥品飲品。
- 含有對肌膚護理尤其重要的維生素B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>，以及乳清酸、葡萄糖酸內酯和菸鹼醯胺。
- 1瓶僅3.7kcal
- 不含咖啡因，在睡前亦可飲用。

## 療效或效果



### 緩和下列各項症狀

皮膚粗糙、青春痘或粉刺、口內炎、口角炎（嘴角兩側出現腫脹或裂痕）、唇炎（嘴唇出現腫脹或裂痕）、皮膚炎、濕疹、皮膚過敏、潰爛、舌炎、臉部潮熱、眼睛充血、眼睛痕癢

「但關於這些症狀，即使使用1個月左右後仍未改善，請諮詢醫師或藥劑師。」

### 下列情況下的維生素B<sub>2</sub>補給

身體疲勞時、懷孕及哺乳期、病中病後的體力低下時

## 用法及用量

成人（15歲以上），請1天1次1瓶（50mL）飲用。

・兒童（未滿15歲）請勿飲用。

## 成分

### 1瓶（50mL）中含成分

成分	含量
維生素B <sub>2</sub> 磷酸酯	38mg
維生素B <sub>6</sub>	50mg
維生素B <sub>1</sub> 硝酸鹽	10mg
菸鹼醯胺	60mg
乳清酸	60mg
葡萄糖酸內酯	300mg

### 添加物

苯甲酸鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉、對羥基苯甲酸酯、香料、乙醯碘胺酸鉀、赤藻糖醇、蔗糖素、甜菊萃取物、沒食子酸丙酯、DL-蘋果酸、酸度調節劑（乙醇0.1mL以下）

1. 成分可能懸浮或沉澱於本劑中，但不影響效果。

2. 服用本劑後，可能會造成尿液變黃，但無須擔心，這是因本劑所含的維生素B<sub>2</sub>被人體吸收後的其中一部分排泄至尿液中所致。

## 注意事項

### ▲ 使用上的注意事項

#### 諮詢事項

1. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感

2. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

腹瀉
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感
3. 若服用1個月左右症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此產品，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。	
4. 請勿換裝至其他容器中。（可能導致誤用或變質）	
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。	

相關部位	症狀

<tbl\_r cells="2