

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由於本產品是根據日本國家法律所製造銷售的產品，因此產品和文件內容不一定會遵守日本國以外的法律規定。
本文件是將日文的產品資訊譯成中文以供您參考，請務必在使用時閱讀。
請妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。



從預防到治療
Eisai.jp

第三類醫藥品

在感到皮膚粗糙或疲勞時

チョコラBB[®]プラス[®]

Chocola BB Plus

維生素補充品チョコラ BB プラス可有效緩和皮膚粗糙、青春痘、口內炎，適合疲勞時服用。吸收力卓越的活性維生素 B₂ 可促進細胞的新陳代謝，並改善皮膚或黏膜的症狀。此外，含有 5 種維生素 B 群的均衡配方能從飲食中所攝取的養分有效轉化為能量，因而有助消除每日的疲勞。在感到皮膚粗糙或疲勞的時候，小小一錠的チョコラ BB プラス不僅便於服用且十分有效。



包裝	建議零售價 (含稅)
60 錠	1,694 日圓
120 錠	3,146 日圓
180 錠	4,466 日圓

相關網站 (日文)



Chocola.com (in Japanese)

療效或效果

緩和下列各項症狀：

皮膚粗糙、青春痘、口內炎、口角炎、唇炎、斑疹、潰爛、濕疹、皮膚炎、舌炎、酒糟鼻、眼睛充血、眼睛癢

「但關於這些症狀，即使使用 1 個月左右也不見改善的情況下，請諮詢醫師或藥劑師。」

補給下列情況下的維生素 B₂：

身體疲勞時、懷孕及哺乳期、病中病後的體力低下時

用法及用量

請依照以下用量於早晚飯後搭配開水或熱水服用。

年齡	1 次用量	服用次數
成人 (15 歲以上)	1 錠	1 天 2 次
兒童 (未滿 15 歲)	請勿服用	

〈用法及用量相關的注意事項〉

若含在口中，可能會使成分溶解而引發苦味，故建議儘速吞下。

成分和主要作用

成人 1 天 2 錠的用量中含有下列成分：

成分	含量	主要作用
核黃素磷酸鈉 (維生素 B ₂ 磷酸酯)	38 mg	• 維持皮膚和黏膜的健康。 • 有助脂肪代謝並轉化為能量。
鹽酸吡哆醇 (維生素 B ₆)	50 mg	• 維持皮膚和黏膜的健康。 • 有助蛋白質代謝並轉化為能量。
硫胺硝化物 (維生素 B ₁ 硝酸鹽)	20 mg	• 有助醣類 (碳水化合物) 代謝並轉化為能量。
菸鹼醯胺	40 mg	• 維持皮膚和黏膜的健康。
泛酸鈣	20 mg	

〈添加物〉

滑石、碳酸鈣、玉米澱粉、羥丙基纖維素、D-甘露醇、阿拉伯膠、棕櫚蠟、氧化鈦、氧化鐵、硬脂酸、硬脂酸鎂、蟲膠、纖維素、二氧化矽、白糖、維生素 B₂、羥丙基甲基纖維素、聚三葡萄糖、聚乙烯 咯烷酮、聚乙烯二醇、磷酸氫鈣

〈成分相關的注意事項〉

服用本劑可能會造成尿液變黃，但無須擔心，這是因本劑所含的維生素 B₂ 被人體吸收後的其中一部分排泄至尿液中所致。



使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後出現下列症狀的情況下有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹
消化器官	胃部不適感

- 服用後可能出現下列症狀，此種症狀持續或變嚴重的情況下請停止服用，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者：

腹瀉

- 即使服用 1 個月左右症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，並攜帶此說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請蓋緊瓶蓋並保管於陽光直射不到且濕度較低的陰涼處。但請勿存放於冰箱內。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝至其他容器中。此外，也請勿將其他藥劑盛裝於本容器內。(可能導致誤用或變質)
4. 掉落等衝擊可能造成錠劑破損，故拿取時請特別小心。
5. 若水分附著於錠劑，其表面可能會有部分溶解、變色斑點的產生，故請勿以沾濕的手觸碰。此外，將潮濕的錠劑放回容器內也會影響其他錠劑的品質，應特別注意。
6. 請勿使用已超過使用期限的產品。
7. 若於使用期限內打開容器瓶蓋，請在大約 6 個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內記錄開封日期。
8. 關上瓶蓋的上蓋時，請按壓直到發出密合的聲音。

諮詢服務：若對本品有不清楚之處，請填寫諮詢表。依諮詢內容等因素，可能需要一段時間處理，但我們將儘速向您回覆。

諮詢表（僅有英語版）：https://inquiry.eisai.co.jp/webapp/form/17672_sdab_2/index.do