

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンE・C複合剤

ユベラ[®]-Cソフト

第3類医薬品

ユベラ-Cソフトは、体内で協力し合うビタミンEとビタミンCを効果的に配合したシュガーフリー（砂糖を含まない）で、しかも味の良い顆粒剤です。

しみ、そばかすや末梢血行障害による肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷えの緩和に、また肉体疲労時や体力低下時のビタミンE・C補給に適しています。



使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- ④ 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ⑤ 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：

肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」



次の場合のビタミンECの補給：

肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を**食後**に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包 	1日3回
小児(7歳以上15歳未満)	½包 	
7歳未満	× 服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

小児(7歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

成人1日量3包(3.6g)中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	300mg	末梢の血行を良くすることによって、全身に酸素や栄養素を運びますので、肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけを緩和します。 色素沈着の原因となる過酸化脂質の増加を防止します。
アスコルビン酸(ビタミンC)	600mg	メラニン色素に働いて、効果的に日やけによる色素沈着やしみ、そばかすを緩和します。 細胞と細胞を結びつけるコラーゲンの生成を促して毛細血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血、鼻出血を予防します。

〔添加物〕

コムギデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、還元麦芽糖水アメ、ビタミンB₂

〔成分に関連する注意〕

ビタミンCの服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。
- ⑤使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「hhcホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00)



製品の内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元

alfresa アルフレッサファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

D12840-3JD