

エーザイ株式会社	パリエットS	胃薬
----------	--------	----

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための

説明文書

パリエット®S



使用前には必ず添付文書をお読み下さい

1	名称	パリエットS
2	成分・分量	1日量(1錠)中 ラベプラゾールナトリウム 10mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	成人(15歳以上)、1回1錠を1日1回、水又はお湯で服用してください。 なお、2週間を超えて続けて服用しないでください。 15歳未満は服用しないでください。 ・本剤は腸で溶けるお薬ですので、かんだり、砕いたりせずに服用してください。 ・1日1回同じ時間帯に服用してください。 ・症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ・3日間服用しても症状の改善が見られない場合は服用を中止し、添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ(本剤は胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬を含んでいます)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 次の医薬品を服用している人:リルピピリン塩酸塩 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の胃腸薬 3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 4. 他のプロトンポンプ阻害薬の使用期間も合わせて2週間を超えて続けて服用しないでください。 (重大な消化器疾患を見逃すおそれがありますので、医師の診察を受けてください。) 【次に該当する人はお申し出ください】 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人:原因不明の体重減少、持続性の胃痛・腹痛 (6) 次の診断を受けた人:肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。