

サクロンQ

第二類醫藥品



サクロン®Q

Saclon Q

セルフメディケーション
税 控 除 対 象

阻隔末梢神經的傳遞。迅速舒緩想吐、噁心及胃痛

サクロンQ是能迅速舒緩因胃酸及酒精等刺激胃黏膜而引起的「想吐、噁心及胃痛」的胃藥。

藥劑為快速配方，服用後能迅速在胃中溶解，成分（奧昔卡因）能直接於胃黏膜發揮功效，迅速改善症狀。

感到胃痛等情況下，可隨時服用。

（1天最多3次，相隔4小時以上服用）

療效或效果



胃痛



宿酔

胃痛、腹痛、噁心（想吐、反胃、宿醉或醉酒時想吐、作嘔、噁心）、嘔吐、腹部突然劇痛（腹絞痛、胸腹疼痛）、胸口灼熱、胃酸過多、胃部不適、打嗝（噯氣）

用法及用量

請將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	2錠	1天最多3次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-

請相隔4小時以上服用。

用法及用量相關的注意事項

請不要嚼碎，直接吞服。（因為是迅速溶解的錠劑，成分在口中散開時，會令口內痠癢。）

取出錠劑的方法

請用指尖用力按壓放有錠劑的包裝膜凸出部位，將背面的鋁箔弄破，然後取出錠劑服用。（如果誤將包裝膜一起吞服，有可能會引致刺穿食道黏膜等的意外事故。）

成分

成分與主要作用

成人1次的量2錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
奧昔卡因	5 mg	直接於胃黏膜發揮功效，阻隔引起胃痛及噁心等的刺激。

添加劑

玉米澱粉、D-甘露醇、硬脂酸鈣、纖維素

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

〔若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用〕

1. 下列的人請勿服用。

- 孕婦或可能懷孕的人
- 未滿15歲的兒童

2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他胃腸藥（含有東莨菪萃取物的藥劑）、其他胃腸鎮痛鎮痙攣藥

3. 請勿長期連續服用。

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- 正在接受醫師治療的人
- 年長者
- 曾因藥品等，引發過敏症狀的人

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
精神神經系統	頭痛、嗜睡、頭暈、全身乏力

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

便秘

4. 若服用5~6次後症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。

2. 請保管於兒童拿不到的地方。

3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）

4. 請勿使用已超過使用期限的產品。

包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅:748日圓（不含稅:680日圓）
12錠	含稅:1,408日圓（不含稅:1,280日圓）