

サクロンQ

제2류의약품



サクロン®Q

Saclon Q

セルフメディケーション
税 控除 対象

말초신경에서 전달을 차단. 메스꺼움・메스꺼움・위통에 빠른 효과.

Saclon Q는 위산이나 알코올 등이 위점막을 자극하여 생긴 ‘메스꺼움・메스꺼움・위통’에 신속하게 효과를 발휘하는 위약입니다.

복용 후 빠르게 용해되는 속효성 제제이므로 위 안에서 금방 녹아 성분(옥세타자인)이 위점막에 직접 작용, 괴로운 증상을 신속하게 개선합니다.

위통이 있을 때 아무 때나 복용할 수 있습니다.

(1일 3회까지로 하며, 복용간격은 4시간 이상 두어야 합니다.)

효능・효과



위통



속취

위통, 복통, 메스꺼움(메스꺼움, 속 울렁거림, 속취・술병에 인한 울렁거림, 느글거림, 구역감), 구토, 급경련통(복부 산통), 속쓰림, 위산과다, 위부불쾌감, 트림

용법・용량

다음의 양을 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	2정	1일 3회까지
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

복용간격은 4시간 이상 두어 주십시오.

용법・용량 관련 주의사항

씹지 말고 바로 삼켜 주십시오.(빠르게 녹는 제제이므로 성분이 입안에 퍼지면 구내 마비감이 남게 됩니다.)

정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 볼록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꽂히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)

성분

성분과 작용

성인 1회량 2정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
옥세타자인	5mg	위점막에 직접 작용하여 위통, 메스꺼움 등의 자극을 차단합니다.

첨가물

옥수수전분, D-만니톨, 스테아린산칼슘, 셀룰로오스

주의사항

▲ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

[지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉽습니다.]

1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

- 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
- 15세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 위장약(스코폴리아엑스를 함유하는 제제), 다른 위장진통진경제

3. 장기간 복용하지 마십시오.

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

- 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 고령자
- 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계 부위	증상
피부	발진・발적, 가려움
정신신경계	두통, 졸음, 어지러움, 탈력감

3. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비

4. 5~6회 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기 안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)

4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

포장및가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:748엔 (세금 별도:680엔)
12정	세금 포함:1,408엔 (세금 별도:1,280엔)