

サクロン錠

第二类医药品



サクロン錠

Saclon Tablets

让胃舒爽的绿色胃药。用于想吐、胃热烧心、饮酒过量

胃部想吐、胃热烧心的症状可能是由于胃酸分泌过多所引起的。另外，因过量饮酒而造成酒精对胃粘膜本身的刺激也是引起的原因之一。

サクロン錠可以减弱（中和）过量的胃酸作用，抑制其分泌，通过由叶绿素制作成的绿色成分可以修复和保护胃粘膜的损伤。

适用会出现胃部想吐、有锐痛症状的人士，或者在早上刷牙时会出现恶心想吐的人士。轻松服下サクロン錠，还您一个舒爽的胃！

效能或效果



胃胀



胃热烧心



胃痛



宿醉

胃热烧心、饮酒过量、胃痛、胃酸过多、胃胀、胃部不适感、胃部胀满感、胃重、胸闷、打嗝、恶心（想吐、反胃、宿醉・醉酒想吐、作呕、恶心）、呕吐

用法及用量

请在饭间及睡前空腹时用水或温水服用下述量。

年齢	1回量	服用回数
成人（15岁以上）	4片	1天3次
8岁以上未满15岁	2片	1天3次
未满8岁	请勿服用	-

※饭间是指进餐后2个小时左右，胃内几乎没有食物时。

用法及用量相关注意事项

儿童（8岁以上未满15岁）请在监护人指导监督下服用。

成分

成分及作用

成人1天的量12片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
叶绿素铜钾	120毫克	修复及保护损伤的胃粘膜。
无水磷酸氢钙	1,020毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
沉淀碳酸钙	1,020毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
氢氧化镁	960毫克	直接中和分泌过量的胃酸。
蕨苔提取物	30毫克	抑制胃酸分泌，止痛。

添加剂

玉米淀粉、羟丙基纤维素、l-薄荷醇、香料、氯化钾、肉桂、硬脂酸镁、聚维酮

成分相关注意事项

- 服用后，粪便可能会变成绿色，这是叶绿素铜钾（绿色）被排泄引起的着色，请不必担心。
- サクロン錠中未使用含铝的成分。

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

〔若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用〕

- 在服用本药剂期间，请不要服用下述医药品。
胃肠镇痛镇痛药
- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。
（药剂可能会进入到母乳中，使婴儿的脉搏加快。）

咨询事项

- 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
 - 正在接受医师治疗的人
 - 孕妇或疑似怀孕的人
 - 老年人
 - 因药物等出现过过敏症状的人
 - 有以下症状的人
排尿困难
 - 接受过以下诊断的人
肾病、心脏病、青光眼、甲状腺功能障碍
- 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒

- 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
口腔干燥、便秘、腹泻
- 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

其他注意事项

可能导致难以产生母乳。

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
- 4片装小袋包装产品，请注意以下事项。
如需服用1包分服后剩余药物时，请将袋口折叠进行保管，当超过2天后请勿服用。
- 96片包装，请注意以下事项。
 - 容器内的填充物用于防止运输中的片剂破损。开封后请扔掉填充物。请将容器密封保存。
 - 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请在6个月内使用为准。请在盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。
- 请勿使用超过使用期限的产品。

包装及价格

包装	建议零售价
40片	含税:1,078日元（不含税:980日元）
96片	含税:2,134日元（不含税:1,940日元）