

セルベール（細粒）

第二類醫藥品



セルベール®

セルフメディケーション
税控除対象

用於腹脹、胸口灼熱，透過黏液屏障去調整虛弱胃部的胃藥

セルベール含有增加胃黏液的成分「替普瑞酮」及「天然藥材」，恢復虛弱胃部的健康。

推薦給平時感到胃部虛弱的人。

- 反覆出現「腹脹」、「胸口灼熱」等胃部不適症狀的人
- 稍微勞累或稍微令胃部帶來負擔就會感到不適的人
- 曾因服用止痛藥、感冒藥引致胃部不適的人

セルベール能夠增加「胃黏液」分泌，保護胃黏膜免受胃酸等刺激，還能提高胃的活性去調節虛弱的胃部。

セルベール是迅速溶解，容易服用的顆粒劑。

守護胃部，恢復胃部健康的『整胃®』功效，讓胃部變得輕鬆。



療效或效果



食欲不振



腹脹

進食過量 ·
飲酒過量

胸口灼熱

腹脹、胸口灼熱、進食過量、飲酒過量、胃部及腹部膨脹感、食欲不振、噁心（想吐、作嘔、噁心）、嘔吐、胸悶



用法及用量

請於餐後將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1包	1天3次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-



成分

成分及主要作用

成人1天的量3包（3g）中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
替普瑞酮	112.5mg	增加胃黏液，保護胃部免受胃酸或酒精的刺激。
乾燥蒼朮萃取物 (蒼朮原料)	150mg (1.5g)	激活減弱了的胃部運動。
乾燥厚朴萃取物 (厚朴原料)	83.4mg (1.0g)	激活減弱了的胃部運動。

添加劑

滑石粉、乳糖、香蘭素、維生素E、羥丙基纖維素、D-甘露醇、I-薄荷醇、香料、肉桂、二氧化矽、薄荷油



注意事項

▲ 使用上的注意事項

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 接受過下列診斷的人
肝臟病

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	腹部膨脹感、噁心、腹痛
精神神經系統	頭痛
其他	皮下出血

極少可能引發下列嚴重症狀。此時請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
便秘、腹瀉、口乾

4. 若服用兩週左右後症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 本藥劑為淡褐色的顆粒劑。由於加入天然藥材作為有效成分，顆粒中有可能混入茶褐色的顆粒，但不會改變其功效。
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。



包裝及價格

包裝	建議零售價
12包	含稅：1,045日圓（不含稅：950日圓）
27包	含稅：2,178日圓（不含稅：1,980日圓）