

新セルベール整胃プレミアム<細粒>

제2류의약품



新セルベール® 整胃プレミアム(細粒)

New Selbelle Premium Fine Granules

セルフメディケーション
税控除対象

더부룩함, 과식에 약해진 위 기능을 개선해주는 위약

위를 보호하는 위점액은 연령과 함께 감소하기 때문에 더부룩함 등의 증상을 느끼기 쉬워집니다.

NEW SELBELLE 위 기능 개선제 PREMIUM <세립>은 의료용과 같은 양을 배합한 위점액을 늘려서 위를 보호해주는 성분 '테프레논'과 위를 움직여주는 '생약', '소화효소'가 약해진 위를 보호하여 건강한 위로 되돌려줍니다.

NEW SELBELLE 위 기능 개선제 PREMIUM <세립>은 인생 100년 시대의 식생활을 도와주는 위약입니다. 본래의 위의 상태를 회복하여 가족, 친구와 맛있는 음식을 즐길 수 있는 행복한 시간을 제공해드립니다.

▲ 최근 들어 위가 약해졌다고 느끼는 분께 추천드립니다.

- 식후에 더부룩함을 느끼는 횟수가 늘어난 분
- 소량이라도 과식 한 것 처럼 느껴지는 분
- 최근 들어 원지 더부룩함을 느끼시는 분
- 위의 작용이 둔해지고, 음식이 위에 남아 있는 것 처럼 느껴지는 분
- 기름진 음식이 부담스러워지신 분에게

NEW SELBELLE 위 기능 개선제 PREMIUM <세립>은 트리플액션으로 더부룩함 등 약해진 위의 증상을 개선해줍니다.

- 보호한다 → 위의 점막을 덮는 '위점액'을 늘려 위를 보호합니다.
- 움직인다 → 위의 운동을 활발하게 합니다.
- 소화한다 → 지방을 분해하여, 소화력을 높입니다.

NEW SELBELLE 위 기능 개선제 PREMIUM <세립>은 금방 녹아 복용하기 쉬운 세립입니다.

위를 보호하고 건강한 위로 되돌려주는 '整胃(위 기능 개선)'*의 작용으로 위가 편해집니다.

효능 · 효과



더부룩함, 과식, 식욕부진, 위부·복부팽만감, 속쓰림, 과음, 메스꺼움(메슥거림, 느글거림, 구역감), 구토, 답답함

용법 · 용량

다음의 양을 식후에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1포	1일 3회
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

성분

성분과 작용

성인 1일 복용량 3포(2.4g) 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
테프레논	150mg	위점액을 늘려서, 위산 및 알코올로 인한 자극으로부터 위를 보호해줍니다.
창출 건조 추출물(원생약으로서 창출)	150mg (1.5g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다
후박 건조 추출물(원생약으로서 후박)	83.4mg (1.0g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다
리파아제 AP6	14.7mg	더부룩함의 주요 원인인 지방의 소화를 도와줍니다

첨가물

셀프, 유당, 바닐린, 비타민E, D-만니톨, L-멘톨, 향료, 에리스리톨, 규산칼슘, 계피, 박하유, 포비돈



주의사항

▲ 사용상의 주의

상담할 사항

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
 - 고령자
 - 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 다음의 진단을 받은 사람

간장병

- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

증상명	증상
간기능장애	발열, 발적, 가려움
피부	복부팽만감, 메스꺼움, 복통
소화기	두통
정신신경계	피하출혈
기타	

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
간기능장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노래짐), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비, 설사, 입마름

4. 2주일 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

증상명	증상
간기능장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노래짐), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.

5. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

포장 및 가격

포장	권장 소비자 가격
12포	세금 포함: 1,100엔 (세금 별도: 1,000엔)
24포	세금 포함: 2,145엔 (세금 별도: 1,950엔)