

new selbelle tablets premium

新セルベール整胃プレミアム錠 >



제2류 의약품

< 셀베ール브랜드 정보

製品詳細・添付文書

+

overview

제품 개요

新セルベール[®]整胃プレミアム錠



더부룩함, 과식에 약해진 위를 정돈해주는 위약

위를 보호하는 위점액은 연령과 함께 감소하기 때문에 더부룩함 등의 증상을 느끼기 쉬워집니다.

NEW SELBELLE 위 운동기능 개선제 PREMIUM<정>은 의료용과 같은 양을 배합한 위점액을 늘려서 위를 보호해주는 성분 '테프레논'과 위를 움직여주는 '생약', '소화효소'가 약해진 위의 기능을 보호하여 위의 상태를 개선해줍니다.

NEW SELBELLE 위 운동기능 개선제 PREMIUM<정>은 인생 100년 시대의 식생활을 도와주는 위약입니다. 본래의 위의 상태를 회복하여 가족, 친구와 맛있는 식사를 즐길 수 있는 행복한 시간을 제공해드립니다.

최근 들어 위가 약해졌다고 느끼시는 이러한 분들께 추천드립니다.

- 식후에 더부룩함을 느끼는 횡수가 늘어난 분
- 소량이라도 과식한 것처럼 느껴지는 분
- 최근 들어 왠지 더부룩함을 느끼시는 분
- 위의 작용이 둔해지고, 음식이 위에 남아 있는 것처럼 느껴지는 분
- 기름진 음식이 부담스러워지신 분에게

NEW SELBELLE 위 운동기능 개선제 PREMIUM<정>은 트리플액션으로 더부룩함 등 약해진 위의 증상을 개선해줍니다.

- 보호한다→위의 점막을 덮은 장막 '위점액'을 늘려 위를 보호합니다.
- 움직인다→ 위의 운동을 활발하게 합니다.
- 소화한다→ 지방을 분해하여, 소화력을 높입니다.

NEW SELBELLE 위 운동기능 개선제 PREMIUM<정>은 1회 1정으로 효과를 볼 수 있는 복용하기 쉬운 정제입니다.

위를 보호하고 건강한 위로 돌려주는 '위 운동기능 개선*'의 작용으로 위가 편해집니다.

효능·효과


용법·용량

성분

주의사항

포장 및 가격

효능·효과



더부룩함, 과식, 식욕부진, 위부·복부팽만감, 속쓰림, 과음, 메스꺼움(역함, 느글거림, 구역질), 구토, 답답함

용법 · 용량

다음의 양을 식후에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1정	1일3회
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

성분

성분과 역할

성인 1일 복용량 3정 중에 다음의 성분을 포함합니다.

성분	함량	역할
테프레논	150mg	위점액을 늘려서 식사 및 위산에 따른 자극으로부터 위를 보호해줍니다.
창출 건조추출물(원생약으로서 창출)	150mg (1.5g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다.
후박 건조추출물(원생약으로서 창출)	83.4mg (1.0g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다.
리파아제 AP6	14.7mg	더부룩함의 주요 원인인 지방의 소화를 도와줍니다.

첨가물

탈크, 비타민E, 부분알파화 전분, 에리스리톨, 규산칼슘, 포비돈

주의사항

▲ 사용상의 주의

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
 - 고령자
 - 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 다음의 진단을 받은 사람
간장병
- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	복부팽만감, 메스꺼움, 복통
정신신경계	두통
기타	피하출혈

드물게 아래와 같은 심한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
간기능장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노랗게), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.

- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비, 설사, 입마름

- 2주일 정도 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기 안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀔 수 있습니다.)
 - 알약 케이스 등에 넣어 보관함으로 인해 제품 및 용기의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
- 습기로 인해 정제의 외관이 변할 수 있으므로, 젖은 손으로 만지지 마십시오.
- 용기 안의 충전재는 수송 중의 정제 파손 방지용입니다. 용기를 개봉한 후에는 버리십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
- 사용기한이 지나지 않았어도 한 번 용기를 개봉한 후에는 품질유지 관점에서 6개월 이내를 기준으로 사용하십시오. 상자 안쪽 뚜껑의 '개봉 연월일'란에 개봉일을 기입하십시오.

포장 및 가격

포장	권장소비자가격
18정	세금 포함:1,045엔 (세금 별도:950엔)
36정	세금 포함:1,980엔 (세금 별도:1,800엔)
72정	세금 포함:2,970엔 (세금 별도:2,700엔)