

# トラベルミン 1 (大人用)

第二類医薬品



# トラベルミン<sup>®</sup> 1

預防及舒緩暈車

- トラベルミン 1，1天1次服用1錠就有效。協助您一整天享受旅程及舒適地乘坐交通工具。
- 像汽水糖錠一樣迅速溶化崩解，在乘坐飛機、車或船等交通工具的過程中不需要水也能服用。
- 包含即使在暈車後才服用亦能發揮效果的成分。有效預防及控制因暈車而引起的噁心及頭暈。



## 療效或效果



暈車藥

預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛



## 用法及用量

請將下列1次量1天1次嚼碎或者溶於口中服用。但，要預防暈車時，請於搭車或搭船前30分鐘服用。

年齡	1次用量	服用次數
15歲以上	1錠	1次
未滿15歲	請勿服用	-



## 成分

### 成分與主要作用

1錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
鹽酸美克洛嗪	50mg	抑制自律神經系統及嘔吐中樞異常興奮的情況。
氯溴酸東莨菪鹼水合物	0.25mg	減輕因乘坐交通工具而引起的知覺混亂。

### 添加劑

紅藻膠、玉米澱粉、D-甘露醇、L-薄荷醇、香料、氧化鐵、聚二甲矽烷、甜菊葉提取物、纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、無水矽酸



# 注意事項

## ▲ 使用上的注意事項

### 禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

#### 1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

#### 2. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

### 諮詢事項

#### 1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正在接受醫師治療的人

2. 孕婦或可能懷孕的人

3. 年長者

4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人

5. 有下列症狀的人

排尿困難

6. 接受過下列診斷的人

青光眼、心臟病

#### 2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，詢諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
精神神經系統	頭痛
泌尿器官	排尿困難

其他

臉發燙、異常目眩

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重，請停止服用，並攜帶此說明書，詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、嗜睡、視力模糊

## 保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。



## 包裝及價格

包裝	建議零售價
3錠	含稅:923日圓 (不含稅:839日圓)