

トラベルミン1 (大人用)

第二类医药品



トラベルミン[®]1

预防和缓解晕车症状

- トラベルミン1，1天1次服用1片即可起效，可助您一天愉快地旅行，轻松地移动。
- 是像汽水糖一样融化的速溶型片剂。在乘坐飞机、汽车、轮船等移动时即使不用水也可以服用。
- 含有在晕车后服用也能起效的成分。除了有预防作用还能缓解因晕车所引起的恶心及头晕的症状。

效能或效果



晕车


预防及缓和因晕车引起的头晕、恶心、头疼



用法及用量

请1天1次咀嚼或放入口中溶解服用以下1次的量。但是为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟前服用。

| 年龄 | 1次剂量 | 服用次数 |
|-------|------|------|
| 15岁以上 | 1片 | 1次 |
| 未满15岁 | 请勿服用 | - |



成分

成分和作用

1片中含有下述成分。

| 成分 | 含量 | 药理作用 |
|-------------|-------|--------------------|
| 盐酸美克利嗪 | 50毫克 | 抑制自主神经、呕吐中枢的异常兴奋。 |
| 东莨菪碱氢溴酸盐水合物 | 0.2毫克 | 减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱。 |

添加剂

卡拉胶、玉米淀粉、D-甘露醇、l-薄荷醇、香料、氧化铁、二甲基聚硅氧烷、甜叶菊纯化提取物、纤维素、聚维酮、二氧化硅



注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。

其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠镇痛镇痉药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）

2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。

（有可能会嗜睡、视线模糊或异常眩光等症状。）

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 正在接受医师治疗的人
- 孕妇或疑似怀孕的人
- 老年人
- 因药物等出现过过敏症状的人
- 有以下症状的人
排尿困难
- 接受过以下诊断的人
青光眼、心脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

| 相关部位 | 症状 |
|--------|----------|
| 皮肤 | 皮疹/发红、发痒 |
| 精神神经系统 | 头痛 |
| 泌尿系统 | 排尿困难 |

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

| 包装 | 建议零售价 |
|----|---------------------|
| 3片 | 含税:923日元（不含税:839日元） |

