

トラベルミン1 (大人用)

제2류의약품



トラベルミン[®]1

멀미 예방과 완화에

- TRAVELMIN 1은 1일 1회 1정 복용으로 효과가 있습니다. 하루 종일 즐거운 여행, 쾌적한 이동을 도와드립니다.
- 쉽게 금방 녹아내리는 ‘라무네’ 캔디 타입입니다. 비행기, 자동차, 배 등으로 이동 중에도 물 없이 복용할 수 있습니다.
- 멀미가 시작된 후에도 효과적인 성분을 배합하고 있습니다. 예방은 물론 멀미로 인한 ‘메스꺼움’과 ‘어지러움’을 진정시켜주는 효과가 있습니다.



효능 · 효과



멀미

멀미로 인한 어지러움 · 메스꺼움 · 두통의 예방 및 완화



용법 · 용량

다음의 1회량을 1일 1회 씹거나 입안에서 녹여 복용하십시오. 단, 멀미 예방 목적으로는 승차 또는 승선 30분 전에 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	1정	1회
15세 미만	복용하지 말 것	-



성분

성분과 작용

1정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
염산메클리진	50mg	자율신경 및 구토 증주의 비정상적인 흥분을 가라앉힙니다.
스코폴라민브롬화수소산염수화물	0.25mg	승차/승선 시 등에 발생하는 감각의 혼란을 경감합니다.

첨가물

카라기난, 옥수수전분, D-만니톨, L-멘톨, 향료, 삼이산화철, 디메틸폴리실록산, 스테비아추출정제물, 셀룰로오스, 포비돈, 무수규산



포장 및 가격

▲ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽습니다.

1. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 위장진통진경제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기약 등)

2. 복용 후, 운전 또는 기계 조작을 하지 마십시오.

(졸음 및 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

- 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
- 고령자
- 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
- 다음의 증상이 있는 사람

배뇨곤란

- 다음의 진단을 받은 사람
녹내장, 심장병

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진 · 발적, 가려움

정신신경계	두통
비뇨기	배뇨곤란
기타	얼굴 흥조, 비정상적인 눈부심

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 변비, 졸음, 눈 침침함

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
3정	세금 포함: 923엔 (세금 별도: 839엔)