

travelmin churop grape

トラベルミン チュロップぶどう 味 (販売名: トラベルミン チュ ロップぶどう味)



제 2류 의약품

◀ [トラベルミンブランド情報](#)

[特長](#)

[製品詳細・添付文書](#)

+

• overview

제품 개요

トラベルミン® チュロップぶどう味

판매명: TRAVELMIN 츄롭 포도맛

멀미 예방과 완화에

TRAVELMIN 츄어블 포도맛은 멀미로 인한 현기증과 구토 등의 증상을 예방, 완화하고 여행 및 외출을 쾌적하고 즐겁게 해 드리는 약입니다.

어린이가 복용하기 쉬운 캔디 타입으로, 출발 전 분주한 상황이나 속이 안 좋을 때도 그 자리에서 바로 복용할 수 있습니다.

효능·효과

▼ 용법·용량


▼ 성분

▼ 주의사항

▼ 포장 및 가격

▼

효능·효과



멀미약 복용에 따른 현기증·메스꺼움·두통의 예방 및 완화

용법·용량

멀미를 예방하기 위해 승차 또는 승선 30분 전에 다음 1회량을 씹거나 입안에 녹여 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	2정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
11세~14세	2정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
5세~10세	1정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
5세 미만	복용하지 말 것	-

또한, 추가 복용할 경우에는 1회량을 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용 횟수는 2회까지입니다.

용법·용량 관련 주의

소아(5세~14세)에게 복용할 경우에는, 보호자의 지도 감독하에 복용하십시오.
수학여행 등에 지참할 경우에는, 사전에 용법, 용량 등 복용방법을 잘 지도하십시오.

주의

- 본제는 씹거나 입안에서 녹여 복용하는 약제입니다. 씹기 어려울 경우에는 치아를 손상시키는 일 등이 없도록 녹여서 복용하십시오. 또한, 잘못하여 목에 걸리는 일이 없도록 충분히 주의하십시오.
- 복용할 때는 1정씩 복용하고, 한 번에 2정을 입 안에 넣지 마십시오.

성분

성분과 역할

1회량(11세 이상) 2정 안에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
d-클로르페니라민말레산염	1.33mg	자율신경에 작용하여, 멀미 증상을 예방·완화합니다.
스코폴라민브롬화수소산염수화물	0.166mg	탈 것에 따라 발생하는 감각의 혼란을 경감합니다.

첨가물

에탄올, 구연산, 프로필렌 글리콜, l-멘톨, 향료, 아세살팜칼륨, 이소말트, 글리세린 지방산 에스테르, 동클로로필린나트륨

주의사항

▲ 사용상의 주의

해서는 안 되는 것

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽다

1. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 진해거담제, 위장진통진경제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기 내복약 등)

2. 복용 후, 탈 것 또는 기계류의 운전조작을 하지 마십시오. (졸음 및 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

상담할 내용

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람.
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 고령자
4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
5. 배뇨곤란이 있는 사람
6. 녹내장, 심장병 진단을 받은 사람

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중단한 후, 이 상자를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
정신신경계	두통
비뇨기	배뇨곤란
기타	얼굴 홍조, 비정상적인 눈부심

드물게 아래와 같은 심한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
재생 불량성 빈혈	푸른 멍, 콧피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.
무과립구증	갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중단한 후, 이 상자를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 변비, 졸음, 눈 침침함

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀔 수 있습니다.)
4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:521엔 (세금 별도:474엔)