

トラベルミン チュロップ レモン味 (品 牌：トラベ ルミン チュロップレモン 味)

第二类医药品



トラベルミン® チュロップレモン味

预防和缓解晕车症状

品 牌：トラベルミン チュロップレモン味

トラベルミン チュロップレモン味能够预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心等症状，让旅行和出行变得轻松愉快。

便于儿童服用的糖丸型制剂，即使在出发前匆忙时或感到不舒服时，也可以马上服用。

效能或效果



晕车

预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心/头痛

用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，咀嚼或放入口中溶解服用以下1次的量。

年龄	1次剂量	服用次数
15岁以上	2片	间隔4小时以上，最多服用2次
11岁~14岁	2片	间隔4小时以上，最多服用2次
5岁~10岁	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
未满5岁	请勿服用	-

同时，如需追加服用，需间隔4小时以上服用1次的量。1天的服用次数不可超过2次。

用法及用量相关注意事项

儿童（5岁~14岁）请在监护人指导监督下服用。如果孩子需要在学校修学旅行等时服用，请事先向孩子说明用法、用量等服用方法。

注意

- 本品是咀嚼或在口中溶解后服用的药剂。难以咀嚼时，请将药剂溶解之后再服用以免损伤牙齿。服用时请充分注意，避免药剂堵住咽喉。
- 请1次服用1片，请勿将2片药同时放入口中。



成分

成分和作用

1次的量（11岁以上）2片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
----	----	------

d-氯苯那敏马来酸酯	1.33毫克	作用于植物神经系统，预防、缓解晕车症状。
东莨菪碱氢溴酸盐水合物	0.166毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱。

添加剂

柠檬酸、l-薄荷醇、香料、乙酰磺胺酸钾、异麦芽酮糖醇、甘油脂肪酸酯、维生素B₂



注意事项

⚠ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。

其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠镇痛镇痉药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）

2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。（有可能会出嗜睡、视线模糊或异常眩光等症状。）

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 正在接受医师治疗的人
- 孕妇或疑似怀孕的人
- 老年人
- 因药物等出现过过敏症状的人
- 排尿困难的人

6. 接受过青光眼、心脏病诊断的人

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本药盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
精神神经系统	头痛
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热、异常眩光

偶尔出现下述严重症状。此时请立即就医。

症状名称	症状
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适难以站稳、血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本药盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:521日元（不含税:474日元）