

# トラベルミンファミリー

제2류의약품



## トラベルミン®ファミリー

### 멀미 예방과 완화에

TRAVELMIN 패밀리는 멀미 증상의 예방 및 완화에 유효한 멀미약입니다.

TRAVELMIN 패밀리는 쉽게 바로 녹아내리는 '라무네' 캔디 타입으로, 여행 중에 버스나 전철 등으로 이동 중에도 물 없이 복용할 수 있습니다.

또한, 멀미가 시작된 후에도 효과적인 성분이 포함되어 있으므로, 여행을 즐길 수 있습니다.

TRAVELMIN 패밀리 하나로 5세 이상의 어린이부터 어른까지 복용할 수 있습니다.

## 효능 · 효과



멀미

멀미로 인한 어지러움 · 메스꺼움 · 두통의 예방 및 완화



## 용법 · 용량

멀미 예방 목적으로는 승차 또는 승선 30분 전에 다음 1회량을 씹거나 입안에서 녹여 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	2정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
11세 ~ 14세	2정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
5才 ~ 10才	1정	4시간 이상 간격을 두고 2회까지
5세 미만	복용하지 말 것	-

또한, 추가 복용할 경우에는 1회량을 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용 횟수는 2회까지입니다.

## 용법 · 용량 관련 주의

소아(5세~14세)에게 복용시킬 경우에는, 보호자의 지도 감독하에 복용하게 하십시오. 수학여행 등에 지참할 경우에는, 사전에 용법, 용량 등 복용방법을 잘 지도하십시오.

## 정제 꺼내는 법

아래 그림과 같이 정제가 들어 있는 PTP 시트의 불록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꺾히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)



## 성분

## 성분과 작용

1회량(11세 이상) 2정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
염산메클리진	25mg	자율신경 및 구토 중추의 비정상적인 흥분을 가라앉힙니다
스코폴라민브롬화수소산염수화물	0.16mg	승차/승선 시 등에 발생하는 감각의 혼란을 경감합니다

## 첨가물

옥수수전분, D-만니톨, L-멘톨, 향료, 삼이산화철, 디메틸폴리실록산, 정제스테비아 추출물, 셀룰로오스, 포비돈, 무수규산



## 주의사항

### ⚠ 사용상의 주의

#### 해서는 안 되는 사항

[지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽습니다.]

##### 1. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 위장진통진경제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기약 등)

##### 2. 복용 후, 운전 또는 기계 조작을 하지 마십시오.

(졸음 및 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

### 상당할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 고령자
4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
5. 다음의 증상이 있는 사람  
    배뇨곤란
6. 다음의 진단을 받은 사람  
    녹내장, 심장병

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계 부위	증상
피부	발진 · 발적, 가려움
정신신경계	두통
비뇨기	배뇨곤란
기타	얼굴 홍조, 비정상적인 눈부심

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 변비, 졸음, 눈 침침함

## 보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
5. 사용기한 내라도 내부 포장(알루미늄 봉지)을 개봉한 후에는, 품질 유지 관점에서 6개월 이내를 기준으로 복용하십시오. 상자 개봉부분의 '개봉 연월일'란에 개봉 날짜를 기입하십시오.



## 포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:880엔 (세금 별도:800엔)