

travelmin r

# トラベルミンR

第2类医薬品



<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

## 产品概要



### 预防和缓解晕车症状

トラベルミンR是能够有效预防和缓解晕车症状的晕车药。  
トラベルミンR不易引起困意，即使晕车后才服用，  
药剂中配合的有效成分也可以让您在乘坐巴士或电车时享受旅行乐趣。  
トラベルミンR从11岁以上儿童到成人均可服用。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

### 效能或效果



预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心/头疼

### 用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，用水或温水服用下述一次的量

年齢	1次剂量	服用次数
15岁以上	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
11岁～14岁	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
未满11岁	请不要服用	-

同时，如需要追加服用，每次服用需间隔4小时以上。1天的服用次数不可超过2次。

#### 用法及用量相关注意事项

儿童（11～14岁）请在监护人指导监督下服用。如需在修学旅行时服用，请事先好好指导用法、用量等服用方法。

#### 如何取出药片

如下图所示，用指尖用力按压装有药片的纸的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不小心把纸板也一起吞进去的话，会导致食物粘膜被刺伤等意外的事故。）



#### 成分

##### 成分和作用

1次的量（11岁以上）1片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
盐酸地芬尼多	16.6毫克	抑制自主神经系统的异常兴奋
东莨菪碱氢溴酸盐	0.16毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱
无水咖啡因	30.0毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱
盐酸吡哆醇（维生素B <sub>6</sub> ）	5.0毫克	对恶心头晕有效

#### 添加剂

滑石粉、玉米淀粉、乳糖、羟丙基纤维素、氧化钛、氧化铁、硬脂酸Mg、纤维素、羟丙甲纤维素、聚维酮，聚乙二醇

#### 注意事项

##### ▲ 使用注意事项

##### 禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。  
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、肠胃镇痛镇痉药，含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）
2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。  
（会出现嗜睡，视线模糊或异常眩光等症状。）

##### 咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
  1. 正在接受医师治疗的人群
  2. 孕妇或有怀孕可能性的人群
  3. 老年人
  4. 因药物出现过过敏症状的人群

5. 有下述症状的人群

排尿困难

6. 接受下述诊断的人群

青光眼，心脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹/发红/发痒
精神神经系统	头疼、漂浮感、不稳定感
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热，异常眩光

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

#### 保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉的场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂放入本容器中。（会导致误服或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。

#### 包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:1,100日元（不含税：1,000日元）