

travelmin

トラベルミン（大人用）

第2类医薬品



<

トラベルミンブランド情報

製品詳細・添付文書

+

overview

产品概要

トラベルミン®

预防和缓解晕车症状

トラベルミン是可以预防和缓解晕车症状的成人用晕车药

如果担心晕车，在乘坐前30分钟服用就可以预防晕车症状。

即使在晕车时，也可以通过服用本药剂来改善“头晕”“恶心”“头疼”等晕车症状，继续享受旅行乐趣。

效能或效果

用法及用量

成分

注意事项

包装及价格

效能或效果



预防和缓解因晕车引起的“头晕”“恶心”“头疼”

用法及用量


为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，咀嚼或放入口中溶解服用以下一次的量。

年齢	1次剂量	服用次数
15岁以上	1片	间隔4小时以上，最多服用3次
未满15岁	请不要服用	-

同时，如需追加服用，每次服用需间隔4小时以上。1天的服用次数不可超过3次。

如何取出药片

如下图所示，用指尖用力按压装有药片的纸的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不慎将纸板也一起吞入的话，会导致食道粘膜被刺伤等意外事故。）



成分

成分和作用

1片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
苯海拉明水杨酸盐	40mg	作用于自主神经系统，预防、缓解晕车症状。
二羟丙茶碱	26mg	抑制因摇晃引起的感觉混乱，预防晕车。

添加剂

滑石粉、玉米淀粉、乳糖、羧甲基纤维素Ca、氢化油、氧化钛、硬脂酸钙、纤维素、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、二氧化硅

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

- 下述人群请不要服用。
接受以下诊断的人群
青光眼，前列腺肥大
- 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）

- 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。
(会出现嗜睡症状)
- 处于哺乳期时请不要服用本药剂，或在服用本药剂时请不要进行哺乳。

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者。
 - 正在接受医师治疗的人群
 - 孕妇或有怀孕可能性的人群
 - 因药物等出现过过敏症状的人群
 - 有下述症状的人群
排尿困难
 - 接受以下诊断的人群
癫痫，甲状腺功能障碍
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	起疹/发红/发痒
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难

- 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、嗜睡

其他注意事项

请注意如果在服用本药期间饮酒，则可能会有很强的药效出现。

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉的场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方
- 请不要移至其他容器中。请不要将其他药剂放入本容器中。(会导致误用或变质。)
- 请勿使用超过使用期限的产品。

包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:660日元 (不含税:600日元)