

travelmin 1

トラベルミン1 (大人用)

제 2류의약품



◀ [トラベルミンブランド情報](#)

[特長](#)

[製品詳細・添付文書](#)

+

• overview

제품 개요

トラベルミン[®]1

멀미 예방과 완화에

- TRAVELMIN 1은 1일 1회 1정 복용으로 효과가 있습니다. 하루 중일 즐거운 여행, 쾌적한 이동을 도와드립니다.
- 라무네처럼 부드럽게 녹는 타입입니다. 비행기, 자동차, 배 등 이동중이라도 물 없이 복용할 수 있습니다.
- 멀미가 시작된 후에도 효과적인 성분을 배합하고 있습니다. 예방은 물론 멀미에 따른 ‘메스꺼움’과 ‘현기증’을 진정시켜 주는 효과가 있습니다.

[효능·효과](#)

[용법·용량](#)

[성분](#)

[주의사항](#)

[포장 및 가격](#)

▼

효능·효과



멀미에 따른 현기증·메스꺼움·두통의 예방 및 완화

용법·용량

다음의 1회량을 1일 1회 씹거나 입 안에서 녹여서 복용하십시오. 단, 멀미를 예방하기 위해서는 승차 또는 승선 30분 전에 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	1정	1회
15세 미만	복용하지 말 것	-

성분

성분과 역할

1정 안에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
염산메클리진	50mg	자율신경 및 구토 중추의 비정상적인 흥분을 가라앉힙니다
스코폴라민브롬화수소산염수화물	0.25mg	탈 것에 따라 발생하는 감각의 혼란을 경감합니다.

첨가물

카라지난, 옥수수전분, D-만니톨, l-멘톨, 향료, 삼이산화철, 다이메틸폴리실록산, 정제 스테비아 추출정제물, 셀룰로오스, 포비돈, 무수규산

포장 및 가격

▲ 사용상의 주의

해서는 안 되는 것

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽다

1. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 진해거담제, 위장진통진경제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기 내복약 등)

2. 복용 후, 탈 것 또는 기계류의 운전조작을 하지 마십시오.

(졸음 및 눈 침침함, 비정상적인 눈부심 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

상담할 내용

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람.
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.
3. 고령자
4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
5. 다음의 증상이 있는 사람
배뇨곤란
6. 다음의 진단을 받은 사람
녹내장, 심장병

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
정신신경계	두통
비뇨기	배뇨곤란
기타	얼굴 홍조, 비정상적인 눈부심

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 변비, 졸음, 눈 침침함

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀔 수 있습니다.)
4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

포장 및 가격

포장	권장소비자가격
3정	세금 포함:923엔 (세금 별도:839엔)