

travelmin

トラベルミン (大人用)

제2류의약품



◀ [トラベルミンブランド情報](#)

[特長](#)

[製品詳細・添付文書](#)

+

• overview

제품 개요

トラベルミン®

멀미 예방과 완화에

TRAVELMIN은 멀미 증상의 예방 및 완화에 유효한 성인용 멀미약입니다.

멀미 걱정이 있을 경우, 승차선 30분 전에 복용하여 멀미 증상을 예방할 수 있습니다. 또한, 이미 멀미가 시작된 경우라도 복용하여 멀미증상인 '현기증'과 '메스꺼움', '두통'을 개선하여 여행을 즐길 수 있습니다.

효능·효과

▼ 용법·용량

▼ 성분

▼ 주의사항

▼ 포장 및 가격

▼

효능·효과



멀미에 따른 현기증·메스꺼움·두통의 예방 및 완화

용법·용량

멀미를 예방하기 위해 승차 또는 승선 30분 전에 다음 1회량을 씹거나 입안에 녹여 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	1정	4시간 이상 간격을 두고 3회까지
15세 미만	복용하지 말 것	-

또한, 추가 복용할 경우에는 1회량을 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용 횟수는 3회까지입니다.

정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 철부를 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꽂히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)

scroll





성분

성분과 역할

1정 안에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
디펜히드라민살리실산염	40mg	자율신경에 작용하여, 멀미 증상을 예방·완화합니다.
디프로필린	26mg	흔들림에 의해 발생하는 감각의 혼란을 억제하고, 멀미를 예방합니다.

첨가물

셀룰로스, 옥수수전분, 유당, 카르멜로오스칼슘, 경화유, 산화티탄, 스테아린산 칼슘, 셀룰로오스, 하이프로멜로스, 마크로골, 무수규산

주의사항

▲ 사용상의 주의

해서는 안 되는 것

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽다

1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

다음의 진단을 받은 사람
녹내장 전립선비대

2. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기 내복약 등)

3. 복용 후, 탈 것 또는 기계류의 운전조작을 하지 마십시오.(졸음 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

4. 수유중인 사람은 본제를 복용하지 않거나 본제를 복용할 경우에는 수유를 피하십시오.

상담할 내용

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람.
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
4. 다음의 증상이 있는 사람
배뇨곤란
5. 다음의 진단을 받은 사람
간질, 갑상선기능장애

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
순환기	두근거림
비뇨기	배뇨곤란

- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 졸음

기타 주의

본 제품을 복용하는 동안, 알코올류를 음용하면 약의 작용이 강하게

나타날 수 있으므로 주의하십시오.

- 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 바뀔 수 있습니다.)
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:660엔 (세금 별도:600엔)